

Untersuchung	Monate											
	3	6	9	12	15	18	21	24	36	48	60	
Anamnese, körp.Untersuch., CEA		X		X		X		X	X	X	X	
Koloskopie		X*		X**							X*	
Abdomensonografie***		X		X		X		X	X	X	X	
Sigmoidoskopie (Rektoskopie) ****		X		X		X		X				
Spiralcomputertomografie x	X											
Röntgen Thorax *****				X				X	X	X	X	

- \* wenn keine vollständige Koloskopie präoperativ erfolgt ist
- \*\* bei unauffälligem Befund (kein Adenom, kein Karzinom) nächste Koloskopie nach 5 Jahren
- \*\*\* eine Metaanalyse ergab einen Vorteil für ein bildgebendes Verfahren zum Nachweis von Lebermetastasen in der Nachsorge. Aus diesem Grund entschied sich die Expertenkommission, das einfachste und kostengünstigste Verfahren anzuwenden.
- \*\*\*\* nur beim Rektumkarzinom ohne neoadjuvante oder adjuvante Radiochemotherapie
- \*\*\*\*\* nur beim Rektumkarzinom kann jährlich eine Röntgen Thoraxuntersuchung durchgeführt werden.
- x nur beim Rektumkarzinom 3 Monate nach Abschluss der tumorspezifischen Therapie (Operation bzw. adjuvante Strahlen-/Chemotherapie) als Ausgangsbefund.